

2003年 小松菜 栽培管理表

1A- = 667m

農地番号		農地番号		農地番号	
農場名		農場名		農場名	
所在地	中国山東省高密市	所在地	中国山東省高密市	所在地	中国山東省高密市
栽培面積	50A-	栽培面積	50A-	栽培面積	50A-
栽培管理者		栽培管理者		栽培管理者	
農場責任者		農場責任者		農場責任者	
品種	夏楽天	品種	夏楽天	品種	夏楽天

作業工程			作業工程			作業工程		
日付	天気・気温・風向風力	作業内容	日付	天気・気温・風向風力	作業内容	日付	天気・気温・風向風力	作業内容
2月27日	曇・15~23℃・東南3-4級	整地、施肥	2月27日	曇・3~16℃・東南3-4級	整地、施肥	3月17日	曇・1~11℃・南3-4級	整地、施肥
3月1日	晴・-2~12℃・東北4-5級	播種	3月6日	晴・5~19℃・東北4-5級	播種	3月18日	晴・3~15℃・東北4-5級	播種
3月3日	曇・4~16℃・北3-4級	灌水	3月8日	晴・2~20℃・北3-4級	灌水	3月20日	曇・7~14℃・北3-4級	灌水
3月10日	晴・11~27℃・南3-4級	苗出芽	3月15日	晴・1~10℃・南3-4級	苗出芽	3月27日	晴・3~20℃・南3-4級	苗出芽
3月13日	晴・6~16℃・南3-4級	苗出芽	3月17日	曇・1~11℃・南3-4級	苗出芽	3月31日	曇・6~20℃・南3-4級	苗出芽
3月20日	曇・7~14℃・北3-4級	間引き、除草	3月24日	曇・1~11℃・北3-4級	間引き、除草	4月4日	小雨・9~13℃・西南3-4級	穀雨
4月1日	晴・7~18℃・北4-5級	施薬	4月1日	晴・7~18℃・南3-4級	施薬	4月8日	晴・7~19℃・北3-4級	間引き、除草
4月4日	小雨・9~13℃・西南3-4級	穀雨	4月4日	小雨・9~13℃・西南3-4級	穀雨	4月10日	晴・15~25℃・南3-4級	施薬
4月8日	晴・10~19℃・西南3-4級	灌水	4月8日	晴・10~19℃・西南3-4級	灌水	4月20日	曇・13~27℃・東北3-4級	施薬
4月10日	晴・15~25℃・南3-4級	施薬	4月10日	晴・15~25℃・南3-4級	施薬	5月11日	晴・15~25℃・南3-4級	サンプル検査
4月20日	曇・13~27℃・東北3-4級	施薬	4月20日	曇・13~27℃・東北3-4級	施薬	5月15日	曇・13~27℃・東北3-4級	収穫開始
5月4日	曇・15~29℃・南3-4級	サンプル検査	5月8日	曇・14~28℃・南3-4級	サンプル検査	使用肥料		
5月8日	晴・16~28℃・南3-4級	収穫開始	5月13日	晴・18~29℃・南3-4級	収穫開始			

使用肥料		使用肥料		使用肥料	
目的	基 肥	目的	基 肥	目的	基 肥
使用時期	2月27日	使用時期	2月27日	使用時期	3月17日
使用肥料名	複合肥料	使用肥料名	複合肥料	使用肥料名	複合肥料
複合肥料	50kg/A-	複合肥料	50kg/A-	複合肥料	50kg/A-

使用農薬			使用農薬			使用農薬		
4月1日	アセタミプリド 防虫 シベルメトリン 防虫	60ml・2000倍 50ml・2000倍	4月1日	アセタミプリド 防虫 シベルメトリン 防虫	60ml・2000倍 50ml・2000倍	4月10日	メタラキシル 病気予防 イマダクロプリド イ-ト 防虫	40g・1000倍 20ml・2000倍
4月10日	メタラキシル 病気予防 イマダクロプリド イ-ト 防虫	40g・1000倍 20ml・2000倍	4月10日	メタラキシル 病気予防 イマダクロプリド イ-ト 防虫	40g・1000倍 20ml・2000倍	4月20日	シロマジン 防虫 イマダクロプリド 防虫 シベルメトリン 防虫	20g・3000倍 10g・3000倍 50ml・2000倍
4月20日	シロマジン 防虫 イマダクロプリド 防虫 シベルメトリン 防虫	20g・3000倍 10g・3000倍 50ml・2000倍	4月20日	シロマジン 防虫 イマダクロプリド 防虫 シベルメトリン 防虫	20g・3000倍 10g・3000倍 50ml・2000倍			

株式会社 フィールド
東京都江東区亀戸5-6-21UIW9BLDG.2階
TEL:03-5609-7680 FAX:03-5609-7689